

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

GAVISCON Liquid Sachets

Αλγινικό Νάτριο
Όξινο ανθρακικό Νάτριο
Ανθρακικό Ασβέστιο

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Αυτό το φάρμακο διατίθεται χωρίς συνταγή γιατρού. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να χρειάζεται να παίρνετε αυτό το φάρμακο με προσοχή για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από αυτό.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές
- Πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό αν τα συμπτώματα χειροτερεύουν ή δε βελτιώθηκαν μετά από 7 ημέρες.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4

Σε αυτό το φύλλο οδηγιών:

- 1 Τι είναι το GAVISCON Liquid Sachets και ποια είναι η χρήση του
- 2 Πριν πάρετε GAVISCON Liquid Sachets
- 3 Πώς να πάρετε GAVISCON Liquid Sachets
- 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
- 5 Πώς να φυλάσσετε το GAVISCON Liquid Sachets
- 6 Λοιπές πληροφορίες

1 Τι είναι το GAVISCON Liquid Sachets και ποια είναι η χρήση του

Το GAVISCON Liquid Sachets ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «κατασταλτικά παλινδρόμησης» τα οποία σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια του στομαχικού περιεχομένου έως μέχρι 4 ώρες εμποδίζοντας το στομαχικό οξύ να διαφύγει από το στομάχι όπου λειτουργεί προς τον οισοφάγο προκαλώντας πόνο και δυσφορία.

Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως της παλινδρόμησης οξέων, της καούρας και της δυσπεψίας (σχετιζόμενης με την παλινδρόμηση), για παράδειγμα, μετά από γεύματα, ή κατά την εγκυμοσύνη, ή σε ασθενείς με συμπτώματα που σχετίζονται με παλινδρομική οισοφαγίτιδα.

2. ΠΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ GAVISCON LIQUID SACHETS

Μην πάρετε το GAVISCON Liquid Sachets

- εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικός (υπερευαίσθησία) σε κάποιο από τα συστατικά του GAVISCON Liquid Sachets καθώς πολύ σπάνια έχουν εκδηλωθεί δυσκολία στην αναπνοή και δερματικά εξανθήματα (βλέπε λοιπές πληροφορίες για πλήρη κατάλογο).

Ιδιαίτερες προφυλάξεις με το GAVISCON Liquid Sachets

Αυτό το φάρμακο περιέχει μικρές ποσότητες νατρίου(6,2 mmol ανά 10ml) και ασβεστίου. (1,6mmol ανά 10ml).

- Εάν σας έχει συσταθεί δίαιτα περιορισμένη σε κάποιο από αυτά παρακαλώ συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Παρακαλούμε μιλήστε με το γιατρό σας όσον αφορά τις περιεκτικότητες αυτών των αλάτων, εάν υποφέρετε ή έχετε υποφέρει από σοβαρή νεφροπάθεια ή καρδιοπάθεια, καθώς συγκεκριμένα άλατα θα μπορούσαν να παρέμβουν σ' αυτές τις παθήσεις.
- Αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 7 ημέρες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Μην πάρετε αυτό το προϊόν εντός δύο ωρών από τη λήψη άλλων φαρμάκων από το στόμα, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη δράση κάποιων άλλων φαρμάκων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς συνταγή

Εγκυμοσύνη και γαλουχία

Μπορείτε να λάβετε αυτό το προϊόν εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Σημαντική πληροφορία με κάποιο από τα συστατικά του GAVISCON Liquid Sachets

Αυτό το προϊόν περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκούς μεθυλεστέρες (E218) και προπυλεστέρες (E216), οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές

αντιδράσεις (ενδεχομένως καθυστερημένες).

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GAVISCON LIQUID SACHETS

Χορηγείται από το στόμα

Ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, και παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω: Ένας έως δύο φακελίσκοι μετά το φαγητό και κατά την κατάκλιση πριν τον ύπνο, ή σύμφωνα με τις οδηγίες (μέχρι 4 φορές την ημέρα) .

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Θα πρέπει να χορηγείται μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Αν πήρατε περισσότερο GAVISCON Liquid Sachets από αυτό που έπρεπε

Εάν πάρετε πολύ περισσότερο από αυτό το προϊόν, είναι απίθανο να σας προκαλέσει βλάβη. Ωστόσο, μπορεί να σας παρουσιαστεί «φούσκωμα». Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν δεν υποχωρήσει το σύμπτωμα αυτό.

Αν ξεχάσατε να λάβετε το GAVISCON Liquid Sachets

Εάν ξεχάσετε μια δόση, δεν είναι αναγκαίο να πάρετε διπλή δόση την επόμενη φορά, απλά συνεχίστε να το λαμβάνετε όπως και πριν.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα το Gaviscon Liquid Sachets μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν εμφανίσετε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες σταματήστε να παίρνετε το προϊόν και συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως.

Πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στις 10.000) πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά. Στα συμπτώματα αυτού μπορεί να περιλαμβάνονται δερματικό εξάνθημα, φαγούρα, δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδα, ή πρήξιμο του προσώπου, των χειλέων, της γλώσσας ή του λαιμού.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς

α. για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649 ενώ

β. για την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων <http://www.eof.gr>, Φαξ: + 30 21 06549585.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε

στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ: μήνας / έτος) που αναφέρεται πάνω στους φακελίσκους και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25°C και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία τους

Μη ψύχετε ή καταψύχετε

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή τα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζεστε πλέον. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το GAVISCON Liquid Sachets

Κάθε φακελίσκος (10 ml) περιέχει 500 mg αλγινικό νάτριο, 267 mg όξινο ανθρακικό νάτριο και 160 mg ανθρακικό ασβέστιο, ως δραστικά συστατικά. Τα άλλα συστατικά είναι καρβομερή, παραϋδροξυβενζοϊκοί μεθυλεστέρες (E218) και προπυλεστέρες (E216), σακχαρίνη νατριούχος, υδροξείδιο του νατρίου, γεύση φυσικής μέντας και κεκαθαμένο ύδωρ. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ζάχαρη ή χρώμα.

Πως είναι το GAVISCON Liquid Sachets και πως συσκευάζεται

Το φαρμακευτικό προϊόν GAVISCON Liquid Sachets είναι ένα υπόλευκο εναιώρημα με άρωμα και γεύση μέντας.

Το GAVISCON Liquid Sachets διατίθεται σε πακέτα των :2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 και 36 φακελίσκων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Ρέκιτ Μπένκιζερ Ελλάς Χημικά ΑΒΕΕ

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564- Κηφισιά, Αθήνα

Τηλ: 2108127276

e-mail: RBHealthcare.gr@ReckittBenckiser.com

Τοπικός αντιπρόσωπος Κύπρου

Lifepharm (Z.A.M.) Ltd
Αγίου Νικολάου 8,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1055

Παρασκευαστής

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την: Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Limited, Hull, HU8 7DS.

Διανομείς εξαγωγών: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, HU8 7DS.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:
Απρίλιος 2016