

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

OTRIVIN®

Xylometazoline hydrochloride

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για σας.

Το παρόν φάρμακο σας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Πάντως πρέπει να χρησιμοποιήσετε το OTRIVIN® προσεκτικά για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Επιβάλλεται να επικοινωνήσετε με γιατρό, εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ή δεν υποχωρήσουν μετά από 5 ημέρες.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το OTRIVIN® και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το OTRIVIN®
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το OTRIVIN®
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το OTRIVIN®
6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OTRIVIN® ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το OTRIVIN® είναι ένα αποσυμφορητικό του ρινικού βλεννογόνου, για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.

Το OTRIVIN® moisturising formula περιέχει ενυδατικά έκδοχα τα οποία βοηθούν στην ανακούφιση των ξηρών, ερεθισμένων ρινικών διόδων.

Το OTRIVIN® menthol περιέχει επιπλέον από τα συστατικά του κανονικού OTRIVIN τις αρωματικές ουσίες μενθόλη και ευκαλυπτόλη

Το OTRIVIN® preservative free δεν περιέχει συντηρητικά.

Η γέλη OTRIVIN® περιέχει μια βάση που εμποδίζει την ξήρανση του ρινικού βλεννογόνου και είναι ιδιαίτερος κατάλληλη για την αντιμετώπιση του σχηματισμού κρούστας στην μύτη.

- **OTRIVIN® moisturising formula:** ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%:
Κάθε 1 ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg
- **OTRIVIN® moisturising formula:** ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 0,1%:
Κάθε 1 ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg
- **OTRIVIN® moisturising formula :** ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1% :

Κάθε 1ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg
Κάθε δόση περιέχει 0,14 ml διαλύματος (0,14 mg/dose)

- **OTRIVIN® menthol preservative free:** ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1%
Κάθε 1ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg
Κάθε δόση περιέχει 0,14 ml διαλύματος (0,14 mg/dose)
- **OTRIVIN® preservative free:** ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1% :
Κάθε 1ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg
Κάθε δόση περιέχει 0,14 ml διαλύματος (0,14 mg/dose)
- **OTRIVIN®, Ρινική γέλη 0,1% w/w**
Κάθε 1gr περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg

Ποια η χρήση του OTRIVIN®

Το OTRIVIN® είναι ένα τοπικό αποσυμφορητικό για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Το OTRIVIN® περιέχει ξυλομεταζολίνη, ένα συμπαθητικομιμητικό παράγοντα που συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία της μύτης αποσυμφορώντας τους βλεννογόνους της μύτης και των γειτονικών περιοχών του φάρυγγα, προσφέροντας γρήγορη και παρατεταμένη ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Έτσι βοηθάει στη διάνοιξη των ρινικών διόδων και επιτρέπει στους ασθενείς που υποφέρουν από φραγμένη μύτη να αναπνέουν καλύτερα.

Η δράση του OTRIVIN® αρχίζει μέσα σε λίγα λεπτά και διαρκεί μέχρι 10 ώρες.

Το OTRIVIN® είναι καλά ανεκτό, ακόμη και από ασθενείς με ευαίσθητο βλεννογόνο.

Η γέλη OTRIVIN® είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για χρήση προς διευκόλυνση της αναπνοής από την μύτη την νύχτα. Περιέχει μια βάση που εμποδίζει την ξήρανση του ρινικού βλεννογόνου κατά συνέπεια είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για την αντιμετώπιση κρυολογημάτων που προκαλούν το σχηματισμό κρούστας στην μύτη.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ OTRIVIN®

Μην χρησιμοποιήσετε το OTRIVIN®

- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του
- σε καταστάσεις μετά από διασφηνοειδή υποφυσιεκτομή (ή μετά από χειρουργικές στις οποίες έχει εκτεθεί η σκληρή μήνιγγα).
- σε ατροφική και αγγειοκινητική ρινίτιδα, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
- σε παιδιά κάτω των 12 χρόνων. Για παιδιά 6-12 ετών ενδείκνυνται οι σταγόνες και το εκνέφωμα 0.05%.

Εάν ισχύει οτιδήποτε από τα παραπάνω, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας γιατί το OTRIVIN® δεν είναι κατάλληλο για εσάς σ' αυτές τις περιπτώσεις.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το *OTRIVIN*[®]

- ***Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό πριν χρησιμοποιήσετε το *OTRIVIN*[®]***
 - εάν υποφέρετε από καρδιοαγγειακές παθήσεις και παθήσεις του θυρεοειδούς.
 - εάν λαμβάνετε αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

Εάν ισχύει κάτι από τα παραπάνω μην χρησιμοποιήσετε το *OTRIVIN*[®] πριν συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το *OTRIVIN*[®], όπως και άλλα ρινικά αποσυμφορητικά, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που εμφανίζουν έντονη αντίδραση στις αδρενεργικές ουσίες, με εκδηλώσεις αϋπνίας, ίλιγγου, τρόμου, καρδιακής αρρυθμίας ή αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας σε περίπτωση ενόχλησης από ανάλογα συμπτώματα.

Όπως και τα άλλα τοπικά αγγειοσυσταλτικά, το *OTRIVIN*[®] δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ημερών. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Η παρατεταμένη ή υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της “εξ αναπηδήσεως” ρινικής συμφόρησης (επιδείνωση ή επανεμφάνιση της ρινικής συμφόρησης).

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

Ο κάθε περιέκτης να χρησιμοποιείται από τον ίδιο μόνο ασθενή, για να αποφευχθεί διασταυρούμενη μόλυνση.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Όπως και με όλα τα συμπαθητικομιμητικά, δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ενίσχυση των συστηματικών επιδράσεων της ξυλομεταζολίνης από την σύγχρονη χρήση των τρικυκλικών ή τετρακυκλικών αντικαταθλιπτικών και των αναστολέων ΜΑΟ, ειδικά σε περίπτωση υπερδοσολογίας.

Κύηση και θηλασμός

Συνιστάται να μη χρησιμοποιείται το *OTRIVIN*[®] κατά τη διάρκεια της κύησης.

Το *OTRIVIN*[®] μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της γαλουχίας μόνο αν κριθεί τελείως απαραίτητο, διότι δεν είναι γνωστό εάν η δραστική ουσία απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν αναφέρεται.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ OTRIVIN®

- **OTRIVIN® moisturising formula και preservative free : ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%, ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 0,1% και ρινικό εκνέφωμα διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1% :**

Για ενήλικες και παιδιά πάνω από 12 χρόνων :

2 έως 3 φορές την ημέρα: 2 ή 3 σταγόνες διαλύματος ή 1 ψεκασμός από τον ψεκαστήρα ή τον δοσιμετρικό ψεκαστήρα σε κάθε ρουθούνι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 5 συνεχείς ημέρες.

- **OTRIVIN® menthol preservative free: ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1%**

Για ενήλικες και παιδιά πάνω από 12 χρόνων :

2 έως 3 φορές την ημέρα: 2 ή 3 σταγόνες διαλύματος ή 1 ψεκασμός από τον ψεκαστήρα ή τον δοσιμετρικό ψεκαστήρα σε κάθε ρουθούνι για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 5 συνεχείς ημέρες.

- **OTRIVIN® ρινική γέλη 0,1%**

Για ενήλικες και παιδιά πάνω από 12 χρόνων :

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα γέλης όσο το δυνατόν βαθύτερα σε κάθε ρουθούνι 2 έως 3 φορές την ημέρα για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 5 συνεχείς ημέρες. Συνιστάται η τελευταία εφαρμογή να γίνεται λίγο πριν την κατάκλιση.

Σε περίπτωση κρυολογήματος που δημιουργεί κρούστα στην μύτη, συνιστάται να προτιμάται η ρινική γέλη.

- Οδηγίες χρήσης / χειρισμού

Το OTRIVIN® πρέπει να χρησιμοποιείται αφού έχετε φυσήξει πρώτα τη μύτη.

Ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%:

Γέρνετε το κεφάλι προς τα πίσω καθώς στέκεστε όρθιος ή κάθεστε, ή αν είστε ξαπλωμένος στο κρεβάτι, γυρίστε το κεφάλι στο πλάι. Ρίξτε τις σταγόνες σε κάθε ρουθούνι και κρατήστε το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω για λίγα λεπτά ώστε να μπορέσει το φάρμακο να διασκορπιστεί στη μύτη.

Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 0,1%:

Για να επιτύχετε ένα καλό ψεκασμό, πρέπει να κρατάτε τον ψεκαστήρα όρθιο με το άκρο του προς τα επάνω. Με το κεφάλι όρθιο, εισάγετε το ρύγχος μέσα στο ρουθούνι. Πιέστε μία φορά απότομα και μετά τραβήξτε το ρύγχος από το ρουθούνι πριν σταματήσετε να πιέζετε τον ψεκαστήρα. Η καλύτερη κατανομή του ψεκασμού επιτυγχάνεται εισπνέοντας ταυτόχρονα ενώ ψεκάζετε.

Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1%:

Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα. Πριν τη πρώτη χρήση χειρισθείτε το μερικές

φορές μέχρις ότου επιτευχθεί ένας ομοιόμορφος ψεκασμός. Τις επόμενες φορές θα είναι έτοιμο για άμεση χρήση.

Εισάγετε το ρύγχος στο ρουθούνι και πιέζετε το επάνω μέρος του ψεκαστήρα σταθερά 1 φορά. Μετά αφαιρείτε το ρύγχος από τη μύτη πριν χαλαρώσετε την πίεση.

Η καλύτερη κατανομή του ψεκασμού επιτυγχάνεται εισπνέοντας ταυτόχρονα ενώ ψεκάζετε.

Τοποθετείστε πάλι το προστατευτικό πώμα.

Ο δοσιμετρικός ψεκαστήρας εξασφαλίζει την καλή κατανομή του OTRIVIN® στην επιφάνεια του ρινικού βλεννογόνου. Η δοσιμετρική βαλβίδα επιτρέπει την ακρίβεια της δόσης και αποκλείει την πιθανότητα υπερδοσολογίας από λάθος.

Ρινική γέλη 0,1%

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα γέλης όσο το δυνατόν βαθύτερα σε κάθε ρουθούνι. Συνιστάται η τελευταία εφαρμογή να γίνεται λίγο πριν από την κατάκλιση.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση OTRIVIN® από την κανονική

Σε σπάνιες περιπτώσεις τυχαίας δηλητηρίασης, συνιστάται η συμπτωματική θεραπεία κάτω από ιατρική παρακολούθηση.

Σε περίπτωση από λάθους κατάποσης, ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το OTRIVIN®

Εάν παραλείψετε μια δόση, χρησιμοποιήστε το μόλις το θυμηθείτε, εντός της επόμενης ώρας. Εάν, όμως, πλησιάζει η ώρα χορήγησης της επόμενης δόσης, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και επιστρέψτε στο τακτικό πρόγραμμα χορήγησης. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το OTRIVIN® 0,1% μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις μπορεί να παρατηρηθούν περιστασιακά: Αίσθημα καύσου στη μύτη ή στο λαιμό, τοπικός ερεθισμός, ξηρότητα ή υπεραιμία του ρινικού βλεννογόνου. Ναυτία, αϋπνία, πονοκέφαλος, αδυναμία.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί συστηματικές αντιδράσεις όπως μη ρυθμικός ή γρήγορος καρδιακός παλμός, αύξηση της πίεσης, παροδικές ανωμαλίες στην όραση και αλλεργικές αντιδράσεις όπως δερματικό εξάνθημα και κνησμός.

Σε μακροχρόνια ή υπερβολική χρήση μπορεί να παρατηρηθεί χρόνιο οίδημα του ρινικού βλεννογόνου και καταστροφή του ρινικού επιθηλίου.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ OTRIVIN®

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το OTRIVIN® μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση στο κουτί.

Menthol preservative free ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0.1%: 24 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C

Preservative free ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0.1%: 36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C. Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη 17 μήνες

Moisturising formula ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0.1%: 36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C με προστασία από τη θερμότητα

Moisturising formula ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 0.1%: 36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C με προστασία από τη θερμότητα.

Moisturising formula ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0.1%: 36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C με προστασία από τη ζέστη.

OTRIVIN® ρινική γέλη 0,1% 36 μήνες σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πέραν των 28 ημερών μετά το πρώτο άνοιγμα.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το OTRIVIN®

- Η δραστική ουσία είναι xylometazoline hydrochloride.
Κάθε 1 ml περιέχει: xylometazoline hydrochloride 1mg

- Τα άλλα συστατικά είναι
OTRIVIN® moisturizing 0,1%

Έκδοχα: Disodium edetate, benzalkonium chloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium chloride, sorbitol, methylhydroxypropylcellulose, water purified.

OTRIVIN® preservative free 0,1%

Έκδοχα: Sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium chloride, disodium edetate, water purified. **Χωρίς συντηρητικά**

OTRIVIN® menthol preservative free 0,1%

Έκδοχα: Sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, disodium edetate, sodium chloride, menthol, eucalyptol (cineole), sorbitol, macrogol glycerol hydroxystearate, water purified. **Χωρίς**

συντηρητικά

OTRIVIN® ρινική γέλη 0,1%

Έκδοχα: Disodium edetate, benzalkonium chloride, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium chloride, sorbitol, methylhydroxypropylcellulose, cremophor RH40, perfume 13F 250, water purified.

Εμφάνιση του OTRIVIN® και περιεχόμενο της συσκευασίας

Menthol preservative free ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0.1%

Φιαλίδιο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με δοσιμετρική αντλία ψεκασμού και ρύγχος (εξάρτημα ρινικής προσαρμογής) από πολυπροπυλένιο με προστατευτικό πώμα από πολυαιθυλένιο.

Περιεχόμενο: 10ml (71 δόσεις)

Preservative free ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0.1%

Φιαλίδιο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με δοσιμετρική αντλία ψεκασμού και ρύγχος (εξάρτημα ρινικής προσαρμογής) από πολυπροπυλένιο με προστατευτικό πώμα από πολυαιθυλένιο.

Περιεχόμενο: 10ml (71 δόσεις)

Moisturising formula ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%

Πλαστικό Φιαλίδιο με σταγονόμετρο και πώμα ασφαλείας. Περιεχόμενο: 10ml

Moisturising formula ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα -0,1%:

Πλαστικό φιαλίδιο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και πολυπροπυλένιο, το οποίο έχει ρύγχος από πολυαιθυλένιο με σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ψεκαστήρας) και προστατεύεται από πώμα πολυαιθυλενίου.

Περιεχόμενο: 10ml

Moisturising formula ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών δόσεων) 0,1%:

Φιαλίδιο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με δοσιμετρική αντλία ψεκασμού και ρύγχος (εξάρτημα ρινικής προσαρμογής) από πολυπροπυλένιο με προστατευτικό πώμα από πολυαιθυλένιο.

Περιεχόμενο: 10ml (71 δόσεις το φιαλίδιο της περιεκτικότητας 0,1%)

Ρινική γέλη 0,1%

Σωληνάριο από αλουμίνιο με εσωτερική προστατευτική επικάλυψη και ρύγχος από πολυαιθυλένιο που περιέχει 10g

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αρ. 1
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2811712

Παραγωγός

- **OTRIVIN® moisturising formula:** ρινικές σταγόνες, διάλυμα 0,1%:
OTRIVIN® moisturising formula: ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 0,1%

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Α-ΕΡΓ. ΑΛΙΜΟΣ
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, ΕΛΒΕΤΙΑ
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, 49ΧΛΜ. ΑΥΛΩΝΑΣ

- **OTRIVIN® moisturising formula** : ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα
(σταθερών δόσεων) 0,1%

OTRIVIN® menthol preservative free: ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα
(σταθερών δόσεων) 0,1%

OTRIVIN® preservative free: ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα (σταθερών
δόσεων) 0,1%

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Α-ΕΡΓ. ΑΛΙΜΟΣ
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, ΕΛΒΕΤΙΑ

- **OTRIVIN®**, Ρινική γέλη 0,1% w/w

NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, ΕΛΒΕΤΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν,
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Για το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.